

doziranje i način primjene

Cijepljenje protiv difterije i tetanusa obavlja se prema programu obaveznoga cijepljenja. Naputci za obvezno cijepljenje sadržani su u nacionalnim programima odnosno programima WHO.

Prije primjene cjepivo treba dobro promućkati!

Za svako cijepljenje treba upotrijebiti novu sterilnu štrcaljku i iglu. Ne smije se cijepiti istom iglom kojom se cjepivo vadilo iz bočice. Treba paziti da cjepivo ne curi po vanjskom obodu igle kako bi se izbjegla reakcija na aluminijev fosfat.

Doza cjepiva je 0,5 ml. Injicira se duboko intramuskularno u lateralni gornji glutealni kvadrant.

moгуće nuspojave

- cjepiva adsorbirana na aluminijeve spojeve mogu izazvati lokalne reakcije poput crvenila, oteknuća, boli i svrbeža, samo ponekad praćene oticanjem drenirajućih limfnih ćvorova. U neke djece na mjestu inokulacije, mjesec dana i dulje, perzistira kvrđica koja nastaje kao reakcija na aluminijev fosfat;
- opće reakcije mogu se manifestirati kao prolazno povišenje temperature i tresavica;
- starija djeca, kao posljedicu alergijskih reakcija na difterićni protein, mogu imati izraženije lokalne i opće reakcije.

rok valjanosti i ćuvanje

Rok valjanosti pripravka oznaćen je na pakovanju. Nakon isteka navedenog datuma, cjepivo se ne smije koristiti. Nakon otvaranja spremnika, cjepivo se mora odmah upotrijebiti.

Cjepivo treba ćuvati na tamnu mjestu, pri temperaturi **od 2 °C do 8 °C**.

Ne smije se zamrzavati! Pri niđoj temperaturi cjepivo mijenja fizikalna svojstva te više nije za upotrebu.

datum revizije upute

07/2000.

broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj

Cjepivo protiv difterije i tetanusa, adsorbirano (kutija: 1 ampula / 1 doza):

UP/I-530-10/00-01/123 (14/08/00.)

Cjepivo protiv difterije i tetanusa, adsorbirano (kutija: 10 ampula / 1 doza):

UP/I-530-10/00-01/124 (14/08/00.)

Cjepivo protiv difterije i tetanusa, adsorbirano (kutija: 50 ampula / 1 doza):

UP/I-530-10/00-01/125 (14/08/00.)

Cjepivo protiv difterije i tetanusa, adsorbirano (kutija: 1 boćica / 10 doza):

UP/I-530-10/00-01/126 (14/08/00.)

Cjepivo protiv difterije i tetanusa, adsorbirano (kutija: 50 boćica / 10 doza):

UP/I-530-10/00-01/127 (14/08/00.)