



### **primjena cjepiva u trudnoći**

Preporuča se pričekati s cijepljenjem do kraja drugog tromjesečja trudnoće.

### **doziranje i način primjene**

Cijepljenje protiv difterije i tetanusa obavlja se prema programu obveznoga cijepljenja. Naputci za obvezno cijepljenje sadržani su u nacionalnim programima odnosno programima WHO.

### **Prije primjene cjepivo treba dobro promućkati!**

**Za svako cijepljenje treba upotrijebiti novu sterilnu štrcaljku i iglu.** Ne smije se cijepiti istom iglom kojom se cjepivo vadilo iz bočice. Treba paziti da cjepivo ne curi po vanjskom obodu igle kako bi se izbjegla reakcija na aluminijev fosfat.

**Doza cjepiva je 0,5 ml.** Injicira se **duboko intramuskularno** u nadlakticu, u područje deltoidnog mišića.

**Primarno cijepljenje** provodi se s dvije doze cjepiva u razmaku od 4 do 6 tjedana.

**Docjepljuje** se jednom dozom nakon 12 mjeseci. Za održavanje potrebne razine zaštitnih antitijela preporuča se docjepljivanje jednom dozom cjepiva svakih 10 godina.

### **moгуće nuspojave**

- cjepiva adsorbirana na aluminijeve spojeve mogu izazvati lokalne reakcije poput crvenila, otekuća, boli i svrbeža, samo ponekad praćene oticanjem drenirajućih limfnih čvorova. U neke djece na mjestu inokulacije, mjesec dana i dulje, perzistira kvržica koja nastaje kao reakcija na aluminijev fosfat;
- opće reakcije mogu se manifestirati kao prolazno povišenje temperature i tresavica;
- kod hiperimuniziranih osoba, kao posljedica alergijskih reakcija na difterični protein mogu se javiti izraženije lokalne i opće reakcije.

### **rok valjanosti i čuvanje**

Rok valjanosti pripravka označen je na pakovanju. Nakon isteka navedenog datuma, cjepivo se ne smije koristiti. Nakon otvaranja spremnika, cjepivo se mora odmah upotrijebiti.

Cjepivo treba čuvati na tamnu mjestu, pri temperaturi **od 2 °C do 8 °C**.

**Ne smije se zamrzavati!** Pri nižoj temperaturi cjepivo mijenja fizikalna svojstva te više nije za upotrebu.

### **datum revizije upute**

07/2000.

### **broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj**

Cjepivo protiv difterije i tetanusa, za djecu iznad 7 godina i odrasle, adsorbirano

(kutija: 1 ampula / 1 doza): UP/I-530-10/00-01/128 (14/08/00.)

Cjepivo protiv difterije i tetanusa, za djecu iznad 7 godina i odrasle, adsorbirano

(kutija: 10 ampula / 1 doza): UP/I-530-10/00-01/129 (14/08/00.)

Cjepivo protiv difterije i tetanusa, za djecu iznad 7 godina i odrasle, adsorbirano

(kutija: 50 ampula / 1 doza): UP/I-530-10/00-01/130 (14/08/00.)

Cjepivo protiv difterije i tetanusa, za djecu iznad 7 godina i odrasle, adsorbirano

(kutija: 1 bočica / 10 doza): UP/I-530-10/00-01/131 (14/08/00.)

Cjepivo protiv difterije i tetanusa, za djecu iznad 7 godina i odrasle, adsorbirano

(kutija: 50 bočica / 10 doza): UP/I-530-10/00-01/132 (14/08/00.)

Cjepivo protiv difterije i tetanusa, za djecu iznad 7 godina i odrasle, adsorbirano

(kutija: 1 bočica / 20 doza): UP/I-530-10/00-01/133 (14/08/00.)

Cjepivo protiv difterije i tetanusa, za djecu iznad 7 godina i odrasle, adsorbirano

(kutija: 50 bočica / 20 doza): UP/I-530-10/00-01/134 (14/08/00.)